

Broedvogelmonitoring project 2026

SMALBROEKEN NOORD – PAPENHOEFSVELD

SOVON PLOT 5674


Vogelwerkgroep Natuurwerkgroep Boxtel | 1 november 2026

Inleiding

In overleg met Gijs Clements, coördinator monitoring projecten en Jolanda Ritter, coördinator vrijwilligerswerk van Natuurmonumenten beheerseenheid Midden-Brabant is de Vogelwerkgroep van de NWG Boxtel in maart 2026 gestart met een broedvogelmonitoring van bijzondere soorten (BMP) in het gebied Smalbroeken noord / Papenhoefsveld. Eerder werd dit gebied al gemonitord in 2020, 2016, 2011 en 2007.


Het onderzochte gebied

Het gebied Smalbroeken noord - Papenhoefsveld is een onderdeel van het Natura 2000 gebied van de Kampina – Oisterwijkse bossen en vennen.




Het inventarisatiegebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Melaniedreef, aan de zuidzijde door de rivier de Beerze, aan de oostzijde door de Mariadreef (langs huize “Kampina”) en aan de westzijde door het verlengde van de Harense dijk.

Het geïnventariseerde gebied is ongeveer 80 ha groot en bevat een aantal gevarieerde landschapselementen. Bos, natte en droge heide, beekdal en oud cultuurlandschap. In 2010 is een aanzienlijke ingreep in het gebied gedaan waarbij een gedeelte bos tussen het open weidegebied (Papenhoefsveld) en de grote heide is gekapt zodat er tussen deze twee open gedeelten meer open ruimte ontstond. Gelukkig konden belangrijke elementen als natte gagelbosschages en vrijstaande grove den opslag behouden blijven. Het gebied wordt begraasd door een kudde vleesrunderen (ongeveer 70 stuks inclusief jongvee).



Ochtendstemming op het Papenhoefsveld, 11 april 2026

Op onderstaand kaartje zijn routes en startpunten weergegeven.



Methoden

LIJST VAN GETELDE SOORTEN

Er werd een BMP bijzondere soorten uitgevoerd. Hieronder de lijst Bijzondere soorten van SOVON met toevoegingen.

Lijst van vogelnamen op alfabet BMP B met fusieafstand 2026

Vogelnaam	Afkort	fusie-afstand	Vogelnaam	Afkort	Fusie-afstand
Aalscholver (Grote)	Aal	500	Koekoek	Koe	nvt
Appelvink	AV	300	Kneu	KN	500
Baardman	BM	500	Knobbelzwaan	KnZ	2500
Bergeend	BE	2500	Kokmeeuw	KoM	500
Blauwborst	BB	200	Krakeend	KrE	1000
Blauwe Reiger	Blr	500	Kramsvogel	KV	500
Bonte Vliegenvanger	BVL	200	Kruisbek	KB	500
Boomklever	BKL	300	Kuifeend	KE	1000
Boomkruiper	BKr	200	Kuifmees	Kf	300
Boomleeuwerik	BL	300	Kwartel	Kw	1000
Boompieper	BP	200	Matkop	Mat	500
Boomvalk	BV	500	Middel bonte specht	MBS	500
Bosrietzanger	B	100	Nachtegaal	N	200
Bosuil	BU	500	Nachtzwaluw	NZ	300
Braamsluiper	BS	300	Nijlgans	Nga	2500
Brandgans	BgA	2500	Oeverzwaluw	OZ	500
Bruine kiekendief	BrK	1000	Paapje	Paap	200
Buizerd	Bui	1000	Patrijs	Pa	500
Canadese Gans (Grote)	CGa	2500	Porseleinhoen	PH	300
Cetti's zanger	CZ	300	Putter	Pu	300/500
Dodaars	DD	500	Raaf	Rf	1500
Draaihals	DH	500	Ransuil	RU	500/1000
Engelse kwikstaart	Ekw	300	Rietgors	RG	200
Europese kanarie	EK	300	Rietzanger	RZ	200
Fitis	F	100	Ringmus	RM	200
Fluiter.	FL	200	Roerdomp	RD	1000
Fuut	Fu	1000	Roodborsttapuit	Rta	200
Gaai	Gaai	300	Rouwkwikstaart	Rouw	300
Geelgors	GG	300	Scholekster	Sc	1000
Gekraagde Roodstaart	GR	200	Sijs	Sijs	300
Gele Kwikstaart	GKw	300	Soepgans	SoeG	2500
Goudhaan	GH	100	Snor	Sn	200
Goudvink	GV	500	Sperwer	Sp	500/1000
Grasmus	GM	200	Spotvogel	SV	200
Graspieper	GP	300	Spreeuw	S	100
Grauwe Gans	Gga	2500	Sprinkhaanzanger	SZ	200
Grauwe gors	GrG	500	Staartmees	SM	500
Grauwe klauwier	GKl	500	Tapuit	Ta	200
Grauwe Vliegenvanger	GVl	200	Tjiftjaf	Tj	200
Groene Specht	GS	1000	Torenvalk	TV	500

	Groenling	G	300		Tuinfluiter.	T	200
	Grote Bonte Specht	GBS	500		Tureluur	Tu	1000
	Grote gele kwikstaart	GGK	500		Turkse Tortel	TT	300
	Grote Lijster	GL	500		Veldleeuwerik	VL	300
	Grote Zilverreiger	GrZi	1000		Velduil	VU	1000
	Grutto	Gr	1000		Visdief	VD	500
	Havik	Ha	1000		Vuurgoudhaan	VGH	200
	Heggenmus	HM	200		Waterral	WR	200
	Holenduif	Hol	300		Watersnip	WS	1000
	Houtduif	HD	300		Wespendief	WD	1000/2000
	Houtsnip	HS	1000		Wielewaal	Wie	500
	Ijsvogel	Ijs	2000		Wilde eend	WE	1000
	Kauw	Ka	300		Witte kwikstaart	WKw	300
	Keep	Keep	200		Wulp	Wu	1000
	Kemphaan	KH	1000		Zanglijster.	Z	300
	Kievit	Ki	1000		Zomertaling	ZT	1000
	Kleine Karekiet	KK	100		Zwarte Mees	ZM	300
	Kleine Barmsijs	Barm	500		Zwarte roodstaart	ZR	200
	Kleine Bonte Specht	KBS	300		Zwarte Specht	ZS	600
	Kleine Plevier	KPL	1000		Zwartkop	ZK	200

: Toegevoegde soorten

NB: Alle overige (zeer) zeldzame soorten ook vermelden!



Natte heide met gagel, 22 april 2026

BEZOEKSCHEMA EN ROUTES

Telschema BMP Smalbroeken - Papenhoefsveld 2026 VWG Boxtel

Datum	Tijd	Weer	Bijzonderh	GEDEELTE / STARTPUNT	
				noord	zuid
Ma 16 feb 2026	19.00		uilentelling	gezamenlijk	
Za 28 feb	8.00		verkenning	gezamenlijk	
Wo 11 mrt	6.30	regen	gecancelled	HJ x	GS x
Za 21 mrt	6.00			GS - b	JAH - b
Wo 1 apr	6.40		Zomertijd	HJ - a	GS - c
Za 11 apr	6.20			JAH - c	HJ - a
Wo 22 apr	6.00			GS - b	JAH - b
Za 2 mei	5.45			JAH - a	HJ - c
Wo 13 mei	5.30			GS - c	HJ - a
Za 23 mei	5.00			HJ - b	GS - b
Wo 3 juni	20.00		Avond	HJ – b	JAH – b
Za 13 juni	4.30			GS - c	HJ - a
Wo 24 juni	21.00		Avond	HJ - b	JAH - b
Za 4 juli	8.00			HJ - a	GS - c
Wo 15 juli	21.00		Avond	JAH - b	HJ - b


Hoofdtellers : HJ: Hans Janssen, GS: Gerard Somers, JAH: Jan Albert Hellings

Overige tellers: Betsie van Leeuwen, Huub Meertens, Ad Sleenhoff, Dick Kuus, Gerda Hellings, Bas van Geffen, Ineke van Brunsschot, Madita Kruithof, Toine Cooijmans, Chris Snik, Henny de Haan, Andre Eijkemans, Ger Lagendijk.

REGISTRATIE VAN WAARNEMINGEN

De BMP werd uitgevoerd met behulp van de App “AviMAP voor Android” op Samsung TAB S2 tablets. De resultaten werden ingevoerd in het AviMAP verwerkingsprogramma op de site van SOVON. De deelbezoeken werden gecombineerd in de beheertool “bezoek groeperen” en de dubbele waarnemingen werden handmatig verwijderd in het AviMAP programma.

Hieronder een voorbeeld van een waarnemingenoverzicht in AviMAP (deelbezoek op 11 april 2026 in deelgebied Zuid).



OVERIGE BIJZONDERHEDEN

De waterstand in het gebied kon dit jaar niet worden afgelezen omdat de nieuwe watermeter aan het begin van de Annadreef niet functioneerde. De waterstand was aan het begin van het seizoen nog redelijk op peil door de aanzienlijke hoeveelheid regen gedurende de winterperiode, maar het voorjaar verliep daarna uitzonderlijk droog. Het voordeel was dat alle delen van het gebied, ook vlak langs de Beerze, goed begaanbaar waren. Voor soorten die van een zeer natte hei houden ,zoals de Watersnip, zal dit niet gunstig zijn geweest.



Redelijk vochtige situatie aan het begin van het voorjaar, 11 april 2026

Resultaten

RESULTATEN 2026

Er zijn er 8 vroege ochtendtellingen, 2 tellingen overdag en 4 avondtellingen gehouden, verdeeld over het broedseizoen van februari tot en met juli. Daarmee voldoet deze BMP aan de voorwaarden van de Handleiding Broedvogelmonitoring van SOVON 2016 en kan deze BMP dus gebruikt worden om samen met resultaten uit de vorige onderzoeken in 2011, 2016 en 2020 trends te onderzoeken in het aantal broedgevallen van de onderzochte vogelsoorten.

VERGELIJKING MET VORIGE JAREN

In onderstaande tabel zijn de resultaten (aantal territoria per soort) weergegeven voor de jaren 2011, 2016, 2020 en 2026. In groen aangegeven zijn de jaren waarin een bepaalde soort een stijgende tendens laat zien, in oranje een dalende tendens. NT geeft aan dat de betreffende soort in dat jaar niet geteld is.

Soort	2011	2016	2020	2026
Appelvink	0	3	3	5
Blauwborst	7	5	11	10
Bonte Vliegenvanger	6	5	8	9
Boomklever	9	9	9	12
Boomkruiper	19	17	26	23
Boomleeuwerik	1	4	5	1
Boompieper	34	26	28	23
Boomvalk	0	0	0	0
Bosuil	3	2	2	1
Bruine Kiekendief	0	0	0	0
Buizerd	1	1	1	3
Fitis	NT	NT	40	40
Fluiter	2	2	0	0
Gaai	NT	2	4	4
Geelgors	0	0	0	0
Gekraagde Roodstaart	13	11	12	17
Goudhaan	NT	1	4	2
Goudvink	3	2	3	1
Grasmus	16	17	12	10
Graspieper	6	5	2	2
Grauwe Gans	0	2	1	5
Grauwe Vliegenvanger	3	5	2	7
Groene Specht	1	3	1	2
Groenling	0	0	1	0
Grote Bonte Specht	17	11	10	10
Grote Canadese Gans	0	0	0	1
Grote Lijster	1	1	2	0
Grote Zilverreiger	0	0	0	0
Havik	1	0	1	1
Heggenmus	NT	NT	3	4
Holenduif	2	5	4	3
Houtduif	2	7	10	7
Houtsnip	4	3	4	0
IJsvogel	0	0	0	0
Kauw	1	0	0	0
Keep	0	0	0	0
Kerkuil	0	0	0	0
Kievit	0	1	0	0
Klapekster	0	0	0	0
Kleine Bonte Specht	4	2	2	4
Kneu	1	5	2	3
Koekoek	5	2	2	3
Kuifmees	1	5	7	5
Kwartel	1	0	0	0

Matkop	2	4	2	3
Merel	NT	NT	NT	8
Midd. Bonte Specht	0	1	2	5
Nachtzwaluw	2	6	7	6
Nijlgans	1	1	0	1
Paapje	0	0	0	0
Putter	2	0	2	4
Raaf	0	0	0	0
Rietgors	1	7	5	3
Roodborsttapuit	11	14	9	12
Scholekster	0	0	0	0
Sijs	0	0	0	0
Sperwer	0	1	0	1
Spreeuw	NT	NT	10	14
Sprinkhaanzanger	6	1	2	0
Staartmees	NT	4	3	4
Steenuil	0	0	0	0
Tapuit	0	0	0	0
Tjiftjaf	NT	NT	21	23
Torenvalk	0	0	1	1
Tuinfluiter	1	5	3	10
Veldleeuwerik	2	5	4	5
Velduil	0	0	0	0
Vuurgoudhaan	0	0	0	1
Watersnip	1	5	0	0
Wespendief	1	1	0	0
Wielewaal	3	2	2	2
Wilde Eend	NT	NT	1	6
Witte Kwikstaart	NT	NT	1	1
Wulp	4	1	1	2
Zanglijster	6	7	6	9
Zwarte Kraai	NT	NT	NT	2
Zwarte Mees	1	1	1	0
Zwarte Roodstaart	0	0	1	0
Zwarte Specht	2	1	2	1
Zwartkop	19	16	22	19
Bever				ja
Das				ja
Eekhoorn				ja
Haas				ja
Ree				ja
Steen/Boommarter				ja
Vos				ja
Wasbeer				ja

Soorten die in aantal toegenomen zijn

Appelvink

Het gaat goed met de Appelvink in dit gebied. Hij houdt van rijk gevarieerd loof- en naaldbos en dat is in het gebied ruim voorhanden. Waarneming van de soort is lastig door het moeilijk te herkennen geluid en het feit dat de vogels tijdens de broedperiode zeer stil zijn.



Blauwborst in het centrale deel met gagel, wilg en berk, 1 april 2026

Blauwborst

Gelukkig is er een stijgende trend in het aantal waargenomen Blauwborsten. Dit komt overeen met een landelijke trend, maar heeft zeker ook te maken met de aanwezige landschapselementen als natte hei, gagelbosschages met opslag van jonge berk en wilg. Het droge weer heeft geen nadelig effect gehad voor deze soort.

Bonte vliegenvanger

Deze soort is over de hele Kampina aan een opmars bezig. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat deze holenbroeder kan profiteren van de veroudering van het bos waardoor veel nestgelegenheid ontstaat. Ditzelfde geldt ook voor de Boomkruiper en in iets mindere mate voor de Boomklever.

Middelste bonte specht

Ook deze soort vaart wel bij zwakkere bomen waar hij met zijn kleine snavel een nest in kan hakken.

Nachtzwaluw

De toename van het aantal Nachtzwaluwen is deels een landelijke trend, maar het meer open karakter van het gebied speelt zo te zien ook een positieve rol.



Nachtzwaluw tijdens avondbezoek op 24 juni 2026 (foto Bas van Geffen)

Soorten die in aantal afgenomen zijn

Graspieper

Voor de Graspieper is er al jaren landelijk een dalende tendens. Intensieve landbouw op weidegebieden is een oorzaak, mogelijk ook verruiging van meer natuurlijke weide en heidegebieden. Van oudsher is de Kampina een gebied met heel veel Graspiepers, vooral in de winterperiode, maar het aantal broedgevallen is danig verminderd. De droge zomers van dit jaar en de afgelopen jaren zijn ook zeker niet gunstig voor deze soort.

Sprinkhaanzanger

Dit is een soort met grote jaarlijkse aantalsvariatie. De oorzaak hiervan is onbekend, mogelijk ligt die in de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika. Dit jaar is een enkele keer één zingend mannetje waargenomen langs de Melaniedreef, maar dat was niet voldoende voor een territorium. Ook deze soort houdt van vochtige struwelen en rietvelden, die echter op de Kampina steeds zeldzamer worden. Alleen in de allernatste gedeeltes (Logtse velden) vinden we nog een aantal Sprinkhaanzangers.

Watersnip

Verspreid over de Kampina komen gedurende het hele jaar Watersnippen voor. Dit jaar was het aantal waarnemingen in het onderzoeksgebied echter beperkt tot één

Watersnip langs de Melaniedreef bij de verkenning in februari. De snelle verdroging en wellicht ook de begrazing (op het Papenhoefsveld) zijn waarschijnlijk de oorzaak dat er geen broedgevallen van de Watersnip in ons gebied zijn waargenomen.

Wulp

De Wulp is op de Kampina bijna uitgestorven. We konden tot in mei nog enkele waarnemingen van een of twee Wulpen registreren, wat nog leidde tot 2 territoria volgens AviMAP, maar er is met zekerheid geen sprake geweest van een (geslaagd) broedgeval.

Bijzondere soorten en waarnemingen

Velduil

Tot onze verrassing zagen we op 21 maart een Velduil vliegen die langs de rand van het bos over de hei vliegen. Het jaar 2026 is inmiddels gekenmerkt als een zeer goed muizenjaar, waardoor er in het hele land opvallend veel Velduilen zijn waargenomen. Na deze ene waarneming is de soort echter in ons plot niet meer gezien.



Velduil aan de rand van de hei in ons plot, 21 maart 2026 (foto Bas van Geffen)

Bosuil en overige uilen, Oehoe

Dit jaar werden er verschillende malen roepende Bosuilen gehoord in de omgeving van huize Kampina en langs de Beerze, echter steeds buiten de grenzen van onze plot. Pas tijdens het avondbezoek van 24 juni was er een geldige waarneming binnen het gebied.

Van de vroeger vrij algemene Ransuil zijn al een aantal jaren geen waarnemingen gedaan op de Kampina. Daarnaast is de Oehoe landelijk aan een opmerkelijke opmars bezig, en werden er waarnemingen gemeld uit aangrenzende gebieden, zoals de Oetendonken. In ons gebied hebben we echter geen sporen van deze soort gevonden en ook geen visuele of auditieve waarneming gedaan.

Van de Steenuil en Kerkuil, die overwegend bij menselijke behuizing in nestkasten broeden maar wel in natuurgebieden foerageren, is deze keer slechts eenmaal (avondbezoek op 24 juni) een roepende Steenuil gehoord in de buurt van huize Kampina.

Roofvogels

De Kampina is van oudsher rijk aan roofvogels. We vonden in ons plot dit jaar 3 broedgevallen van de Buizerd, waarvan 1 aan de westelijke grens van het gebied.

Net als de vorige keer in 2020 vonden we een broedgeval van de Havik in het bosrijke gedeelte langs de Beerze (Smalbroeken noord), nu echter zo'n 500 meter meer naar het zuidwesten.

Er waren 3 waarnemingen van een individuele Sperwer, wat volgens AviMAP leidt tot een territorium. We hebben echter geen indicatie gevonden voor een nest of een broedend paar.

Er waren in de telperiode van februari tot juli geen waarnemingen van een Wespendief in ons gebied, wel was er op 20 juni een waarneming van een Slangenarend boven ons gebied (losse waarneming J A Hellings).

Houtsnip

Bij bezoeken in februari en maart werden bij 3 gelegenheden Houtsnippen opgestoten. Tijdens de avondbezoeken werden echter geen Houtsnippen waargenomen. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, maar de waarneming berust vooral op baltsvluchten van de mannetjes en die waren dit jaar in juni al sterk afgenomen (gebaseerd op onze eigen waarnemingen in een ander gebied (Kinderbos)). Hier kunnen dus geen conclusies aan worden verbonden voor de trend in het voorkomen van deze soort.

IJsvogel

Op 4 juli zagen we langs de Beerze herhaaldelijk een of meer IJsvogels, wat de indruk wekte van de nabijheid van een bewoond nest. Omdat dit buiten de datumgrenzen ligt is dit niet erkend als een territorium en / of broedgeval, maar het kan hier toch gaan om een tweede nest van een paartje IJsvogels.

Grauwe vliegenvanger

Al heel veel jaren broedt er een Grauwe vliegenvanger op een plankje onder het dak van huize Kampina. Ook in de rest van het gebied komen steeds meer vrij broedende paartjes voor. Dat leidde tot 7 territoria.



Grauwe vliegenvanger voert jong op nest aan huize Kampina, 13 juni 2026

Fitis en andere bosrandstruweelvogels

Het gebied Smalbroeken noord / Papenhoefsveld is vooral rijk aan (vochtig) struweel langs de bosranden en als zodanig is het ook extreem rijk aan de daarbij behorende vogelsoorten. Daarbij springt vooral de Fitis in het oog met maar liefst 40 territoria, het zijn er zoveel dat ze soms moeilijk te tellen zijn. Ook elders op de Kampina zien we plaatselijk hoge dichtheden, maar er zijn ook gedeeltes waar ze nauwelijks voorkomen. Landelijk zien we vooral hoge dichtheden in de moerasgebieden in Drenthe, Friesland en Overijssel en op de Veluwe, in Noord Brabant eigenlijk alleen in de Biesbosch, de Peel en de Maasduinen. Andere soorten die in hoge aantallen in ons gebied voorkomen zijn de Boompieper (23 territoria), Gekraagde roodstaart (17), Grasmus (10), Roodborsttapuit (12) en de Tuinfluiter (10 territoria).

Overige waarnemingen, “bijvangsten”.

Insecten

Naast de gebruikelijke libellen, zoals de Weidebeekjuffer en de Bosbeekjuffer, zagen we opvallend veel Hoornaars (vooral Europese) die afkwamen op de lekkende sapstromen van vooral eiken die in slechte staat verkeerden. Daarbij ook heel veel vlinders als de Atalanta, maar ook eenmaal de zeldzame Grote weerschijnvlinder.



Grote weerschijnvlinder op de stam van een eik in slechte conditie, 4 juli 2026

Zoogdieren

Tijdens de inventarisatie-rondes kwamen we geregeld Reeën tegen; ook Hazen en Eekhoorns werden gezien. Van andere soorten vonden we sporen zoals van de Bever, Vos, Steen- (en/of Boom-) marter en de Das. Langs de oevers van de Beerze vonden we naast veel Beversporen ook veel kleinere voetafdrukken, mogelijk van ratten en nertsen. Een heel bijzondere was een duidelijke print van een Wasbeer, die we op 11 april langs de Beerze aantroffen. Dit was echter eenmalig, zodat we niet kunnen zeggen of deze soort zich nu ook daadwerkelijk heeft gevestigd.



Print van een Wasbeer gevonden langs de Beerze, 11 april 2026

Discussie en conclusies

Ook dit jaar hebben we weer vast kunnen stellen dat het onderzoeksgebied een prachtige variatie aan landschapselementen herbergt en in overeenstemming daarmee een rijke diversiteit aan vogels huisvest. We zagen 75 soorten vogels, waarvan 53 soorten een territorium hadden.



Gekraagde roodstaart , 22 april 2026

Ondanks ook hier merkbare effecten van verdroging is het gebied nog vochtig genoeg voor de Blauwborst, maar een soort als de Rietgors en de Watersnip hebben het er duidelijk moeilijk mee. Verdroging en mogelijk ook verzuring leidt hier, net als in grote delen van de provincie tot massale sterfte van vooral eiken, maar ook wel ander soorten grotere bomen (berk, beuk, larix). De kwaliteit van het bosgebied gaat duidelijk achteruit. Dit heeft (voorlopig) een gunstig effect op holenbroeders als spechten, Boomklevers, Bonte vliegenvangers en Spreeuwen. Op termijn zal de achteruitgang in de kwaliteit onvermijdelijk leiden tot verschraling van de biodiversiteit van het gebied.



Zonsondergang tijdens avondbezoek, 15 juli 2026

Sinds de vorige telling in 2020 is de begrazing door vleesrunderen hetzelfde gebleven, de pony's zijn echter weggehaald. De eerdere bezwaren tegen overbegrazing en schade door de rondtrekkende kuddes zijn daardoor verminderd, maar voor vogels is met name het Papenhoefsveld nog steeds weinig aantrekkelijk. Een stuk van het veld is uitgerasterd met verruiging als effect, maar we hebben geen toe- of afname van vogels in dit gedeelte kunnen waarnemen.

.

Conclusie

Eerder concludeerden we dat de resultaten van de tellingen in 2016 en 2020 een redelijk constant beeld gaven en daarmee als nulmeting voor de studie van effecten van in de toekomst te nemen beheersmaatregelen konden dienen. Uit de resultaten over 2026 blijkt dat het meer open karakter van het gebied een gunstige invloed heeft op soorten als roodborsttapuit, veldleeuwerik, boompieper en nachtzwaluw. Ook de struweelvogels zijn goed op peil gebleven. Soorten die gevoelig zijn voor verdroging hebben het daarentegen zeer moeilijk om zich te handhaven.

Aanbevelingen

Maatregelen voor het tegengaan van verdere verdroging en verzuring zijn zeker gewenst, ook om de variatie aan vogels te handhaven.

Het Papenhoefsveld zou gevarieerder gemaakt kunnen worden door kleinere “pollen” met bijvoorbeeld braam of ander struweel op te laten schieten (en af te rasteren) waar soorten als Bosrietzanger, Tuinfluiter en misschien zelfs Grauwe klauwier zich thuis zouden kunnen voelen.

Bijlagen

1. Soortkaarten 2026 uit AviMAP

   Per soort (met een of meer territoria) een kaart in pdf format met het aantal territoria binnen het gebied (rode stip. In het totaal 53 soorten met territoria, binnen en/of buiten het gebied.

Auteur en foto’s (tenzij anders vermeld) : J A Hellings